

【外注検査*SRL】

麻疹（PA）中止に関するお知らせ



2023年3月

株式会社グッドライフデザイン

この度、麻疹（PA法）が検査受託中止となります為ご案内申し上げます。尚、代替項目としては以下の項目をご提案したく存じます。何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【項目】

麻疹（PA）*SRL 中止理由：試薬販売中止のため

【変更日】

2023年4月1日（土） 受付分より

【代替項目】

麻疹ウイルス IgG（EIA）*SRL

【ワクチン接種効果判定について】

ワクチン接種後の効果判定は、現行項目、代替項目どちらの測定法でも評価可能です。（下記表参照）

表1 MMRV 抗体価と必要予防接種回数（予防接種の記録がない場合）			
	あと2回の予防接種が必要	あと1回の予防接種が必要	今すぐの予防接種は不要
麻疹	EIA法 (IgG) 2.0未満 PA法 1:16未満 中和法 1:4未満	EIA法 (IgG) 2.0以上16.0未満 PA法 1:16、1:32、1:64、1:128 中和法 1:4	EIA法 (IgG) 16.0以上 PA法 1:256以上 中和法 1:8以上

また、麻疹に関するその他の測定法については、ガイドラインにおいて第一選択としては推奨されておりません。

（抜粋内容）

- ・中和法は検査に時間がかかるため、多くの検体をスクリーニング目的で検査するには不適です。
- ・CF法、HI法はPA法、EIA法に比べ感度が低いため、免疫有無を検査する目的にはあまり推奨できません。

引用ガイドライン：日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第3版」

国立感染症研究所「医療機関での麻疹対応ガイドライン 第7版」

【検体提出に関する変更内容】

	現行項目	代替項目
項目名	麻疹 (PA)	麻疹ウイルス IgG (EIA)
保存条件	冷蔵（変更なし）	
所要日数	3～5日	2～4日
検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL

【依頼方法について】

依頼方法に関しましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

以上

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学部門（内線：5201、5202）